



UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction des services vétérinaires

Procédure normalisée de fonctionnement

Objet : Analgésie et anesthésie des lapins	Numéro : A-3
Portée : Ceci est une directive de la Direction des services vétérinaires à l'intention des utilisateurs et du personnel des animaleries de l'Université Laval (campus et centres de recherche affiliés).	
Préparée par Stéphanie Caron <i>Technicienne en santé animale conformité, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 7 août 2012
Modifiée par Jessie Tremblay <i>Technicienne en santé animale conformité, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 28 juin 2018
Révisée par Anne-Marie Catudal, Geneviève Fortin Simard <i>Vétérinaires, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 3 juillet 2018
But : Décrire les procédures d'analgésie et d'anesthésie chez les lapins.	Version 3

Généralités

- Lorsque la douleur est prévisible, l'analgésie doit être administrée avant le stimulus douloureux. Une procédure jugée douloureuse chez l'être humain doit être considérée comme douloureuse chez l'animal également. En cas de doute, il faut toujours et en priorité considérer le bien-être de l'animal.
- L'utilisation d'une analgésie multimodale est à privilégier en tout temps afin d'optimiser le bien-être de l'animal.
- La douleur et la détresse ressenties chez l'animal peuvent altérer les résultats expérimentaux. Les utilisateurs d'animaux et le personnel de soins doivent être en mesure de reconnaître les signes de douleur et de détresse chez les animaux.
- L'anesthésie avec des agents injectables doit être justifiée scientifiquement. Dans les cas où ce serait requis, le protocole anesthésique devra être établi en collaboration avec les vétérinaires et inscrit dans le protocole expérimental.
- Un tapis chauffant doit être utilisé en tout temps lors d'une procédure sous anesthésie pour éviter l'hypothermie.
- Il faut en tout temps appliquer un onguent ophtalmique dès la perte de conscience pour prévenir un assèchement de la cornée, et ce peu importe la méthode anesthésique utilisée.
- La surveillance anesthésique doit être effectuée en tout temps par un technicien en santé animale de l'animalerie ou un vétérinaire.

Définitions

- Analgésie : diminution ou suppression de la sensibilité à la douleur.
- Analgésie multimodale : consiste à associer des médicaments analgésiques et des techniques ayant des sites d'action différents et complémentaires, à l'origine d'interactions additives voire synergiques
- Anesthésie : perte de conscience locale, partielle ou générale.
- Bloc local : infiltration d'anesthésique local.
- Décubitus sternal : animal couché sur le ventre.
- Induction : premier temps de l'anesthésie générale qui consiste à endormir l'animal.
- Sédation, tranquillisation : administration de drogue qui calme et diminue l'angoisse ressentie par l'animal.
- TRC : temps de remplissage capillaire.

Procédure

Analgésie

- Administrer l'analgésique avant de débiter la procédure douloureuse.
- Il existe trois types d'analgésiques soient : les opioïdes, les AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien) et les anesthésiques locaux. Une analgésie de type multimodal est à privilégier (opioïdes et/ou AINS et/ou anesthésie locale).
- La fréquence d'administration et la durée d'analgésie minimale dépendent de la drogue et du caractère invasif de la procédure (Tableau 11 et tableau 2).
- Les anesthésiques locaux sont utilisés pour des interventions mineures ou pour bloquer les sensations d'une région limitée (tableau 3). La toxicité systémique (incluant des convulsions ou même la mort) peut être évitée en respectant les doses maximales. Il faut également être prudent de ne pas injecter dans la circulation sanguine.
- Le bloc local doit obligatoirement être fait après l'induction. Le volume administré doit être suffisant pour couvrir la zone d'incision sans toutefois causer une distorsion des tissus.

Sédation

- Plusieurs agents seuls ou en combinaison peuvent être utilisés lors de procédures non invasives comme des examens dentaires, des radiographies, etc. Ces agents doivent être choisis spécifiquement pour les besoins de la manipulation : sédation avec ou sans relaxation, durée de la sédation, effets secondaires, etc.
- Choisir en collaboration avec les vétérinaires, le ou les agents sédatifs à utiliser pour la manipulation à effectuer.
- Administrer les doses et volumes requis tel qu'inscrits au protocole expérimental.

Anesthésie

Préparation de l'animal

- Mettre à jeun l'animal (nourriture uniquement) : 1-6 heures **seulement si** une chirurgie abdominale est effectuée.
- Effectuer un examen physique complet (apparence générale, auscultation cardiaque et pulmonaire, TRC, signes cliniques) et prise de poids.

Préparation du matériel

- Calculer les doses des drogues d'urgence (voir formulaire suivi d'anesthésie-lapin).
- Démarrer le tapis chauffant environ dix minutes avant de commencer. Utiliser un tapis à circulation d'eau comme source de chaleur. L'usage des tapis chauffants électriques est à proscrire, vu les risques de brûlures.
- Vérifier l'étanchéité de l'appareil d'anesthésie, sa date de calibration ainsi que le niveau d'oxygène. Vérifier le niveau d'isoflurane lorsqu'applicable. Utiliser un ballon réservoir de volume adéquat, selon la grosseur de l'animal (0,5 litre pour un animal pesant entre 1 et 5 kg).
- Préparer le matériel nécessaire à l'anesthésie et au suivi anesthésique (oxymètre, stéthoscope, tubes endotrachéaux (2,5 mm à 4,0 mm), etc.).

Prémédication

- Administrer la prémédication afin de tranquilliser l'animal :

Prémédication	Dose (mg/kg)	Voie d'administration*	Notes
Acépromazine	1	SC / IM	Ne procure aucune analgésie

* SC : sous-cutané, IM : intramusculaire

- Poser un cathéter intraveineux selon la PNF AD-3 Pose de cathéter intraveineux. Administrer des fluides à raison de 5 ml/kg/heure à l'animal. Il est préférable pour les chirurgies de longue durée d'administrer du LRS-5 % dextrose pour maintenir une pression sanguine normale et un taux de glucose sanguin normal chez cette espèce.
- Administrer l'analgésie et le bloc local.

Induction

- Administrer de l'oxygène au masque pendant les 5 minutes précédant l'induction, pour éviter la diminution de l'oxygénation de l'animal au moment de l'induction.
- Induire l'anesthésie :

Agent d'induction	Dose (mg/kg)	Voie d'administration*	Durée d'action	Notes
Propofol	5-6	IV, à effet	5-10 min	Injecter lentement, apnée fréquente
Isoflurane	3-4 %	Inhalation	Très courte	Utiliser un masque pour l'induction

* IV : intraveineux

- Porter une attention à la respiration de l'animal lors de l'induction avec de l'isoflurane, les lapins ont tendance à retenir leur respiration lorsqu'ils sentent l'isoflurane.
- Mettre un onguent ophtalmique dans les yeux de l'animal.

Intubation

L'intubation du lapin peut s'avérer ardue pour des raisons anatomiques; pour de courtes procédures il est possible d'anesthésier l'animal avec un masque, le plus étanche possible.

- Une fois l'anesthésie induite, placer l'animal en décubitus sternal ou dorsal.
- Vaporiser environ 0,05 ml à 0,1 ml de lidocaïne sur les aryténoïdes et attendre 1-2 minutes (cette étape peut être faite avant l'induction).
- Choisir le tube endotrachéal de grandeur appropriée (le ballonnet doit avoir été préalablement testé pour s'assurer qu'il ne fuit pas).
- Lubrifier légèrement le tube à l'aide de gelée lubrifiante (ex. : K-Y).
- Intuber l'animal et fixer le tube en place à l'aide d'une bande extensible derrière les oreilles.
- Brancher le tube de l'appareil à anesthésie, ouvrir l'oxygène (150 ml/kg/min) et l'isoflurane (1 à 3 %).
- Gonfler le ballonnet. Vérifier pour des fuites et regonfler le ballonnet si nécessaire.

- Vérifier l'emplacement du tube endotrachéal : fermer la valve, presser doucement le ballon respiratoire en auscultant chacun des poumons de l'animal. Rouvrir la valve.

Maintien

- S'assurer d'avoir un niveau d'anesthésie adéquat pour la procédure (Tableau 4).
- Diminuer ou augmenter le niveau d'isoflurane au besoin.

Surveillance anesthésique

- Ne jamais laisser un animal anesthésié sans surveillance.
- La surveillance des signes vitaux doit se faire de manière continue dès la perte de conscience, jusqu'au réveil complet (voir tableau 5).
- Enregistrer les données sur le formulaire de suivi d'anesthésie.

Réveil

- Fermer le vaporisateur d'isoflurane et purger le système en prenant soin de débrancher l'animal de la machine.
- Fournir de l'oxygène pur à l'animal pendant 2 à 5 minutes.
- Placer l'animal dans un endroit propre et calme.
- Extuber l'animal après le retour du réflexe de déglutition, de mastication ou si l'animal lève la tête.
- Continuer d'administrer des fluides jusqu'à ce que l'animal soit réveillé. Réchauffer l'animal au besoin.
- Retourner l'animal dans sa cage lorsqu'il peut se tenir en décubitus sternal et que sa température a atteint 37 °C.
- Redonner accès à la nourriture dès que l'animal est éveillé.
- Retirer le cathéter une fois l'animal bien éveillé.

Tableau 1 : Durée minimale d'analgésie et type d'analgésie recommandé

Niveau de douleur lié à la procédure	Durée d'analgésie minimale	Exemples de procédures	Type d'analgésie multimodal recommandé
Léger	24 heures après la procédure	castration, pompe sous-cutanée, canulation	AINS ou opioïde + anesthésique local
Modéré	48 heures après la procédure	ovario-hystérectomie, pompe intra abdominale	AINS ou opioïde + anesthésique local
Majeur	72 heures après la procédure	chirurgie articulaire, thoracotomie	AINS + opioïde puissant + anesthésique local

Tableau 2 : Analgésiques fréquemment utilisés

Analgésique	Dose (mg/kg)	Voie d'administration *	Fréquence	Type d'analgésique
Buprénorphine ♣	0,01–0,05	SC / IM / IV	8-12 h	opioïde
Hydromorphone ♣	0,05-0,2	SC / IM	8-12 h	opioïde puissant
Carprofen	2,2-4,4	SC / PO	12-24 h	AINS
Meloxicam	0,1-0,3	SC / PO	24 h	AINS

* SC : sous-cutané, IM : intramusculaire, IV : intraveineux, PO : per os (oral)

♣ : Drogue contrôlée

Tableau 3: Anesthésiques locaux

Anesthésique	Dose maximale par animal	Voie d'administration	Délai d'action	Durée d'action
Lidocaïne en solution injectable	10 mg/kg	infiltration locale	10-15 min	1-2 h
Bupivacaïne	4 mg/kg	infiltration locale	20-30 min	3-6 h
Crème EMLA® (lidocaïne-prilocaine)	Épaisse couche	application cutanée avec pansement occlusif	30-60 min	1-2 h

Tableau 4 : Surveillance de profondeur anesthésique

Profondeur d'anesthésie	Fréquence ♥	Fréquence respiratoire	TRC	Couleur des muqueuses	Réflexe de retrait/palpébral	Température moyenne (°C)
Légère	Élevée	Rapide	< 2 sec	Roses	Présent/présent	Normale
Modérée	Régulière	Ralentie	< 2 sec	Roses	Léger/léger	Normale
Profonde*	Ralentie	Profonde et régulière	< 2 sec	Roses	Absent/absent	Normale à basse
Sévère	Lente	Lente et difficile	> 2 sec	Pâles ou bleues	Absent/absent	Basse

* Profondeur d'anesthésie visée pour une procédure chirurgicale.

Tableau 5 : Valeurs normales pour un animal éveillé

Température moyenne (°C)	Fréquence ♥ moyenne (bpm)	Fréquence respiratoire moyenne (rpm)
39,0 ± 0,5	130-325	32-60

Ces valeurs tendent à diminuer chez un animal sous anesthésie générale.

Références

Konaboun Jean-Jacques, débit “traditionnel” de fluides intraveineux lors d’anesthésie générale : la goutte d’eau en trop ?, 2014.

Longley, LA, *Anaesthesia of Exotic Pets*, Saunders, 2008.

Papich, GM, *Saunders Handbook of Veterinary Drugs*, 2nd edition, Saunders, 2007.

Plumb, Donald C., *Plumb’s veterinary drug handbook*, 5th edition, 2004.

Thurmon, JC, Tranquilli, WJ, Benson, GJ, *Lumb and Jones’ veterinary anesthesia*, third edition, 1996.

Hawk, Terrance, Leary, Steven, Morris, Timothy, *Formulary for Laboratory Animals*, 3rd edition, Blackwell Publish, 2005.

Fish, RE, Brown, MJ, Danneman, PJ, Karas, AZ, *Anesthesia and analgesia in laboratory animals*, 2008.

CCPA, *Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation*, 1993.

Katherine E. Quesenberry, James W. Carpenter *Ferrets, Rabbits and Rodents, clinical medicine and surgery*, 2nd edition, 2003.

Mises à jour de la PNF		
Version 2	31 août 2015	Ajout de la définition d’une analgésie multimodale Modification du volume de fluidothérapie
Version 3	3 juillet 2018	Ajout de la définition du bloc local. Ajout de l’administration de l’analgésie et du bloc local dans la section prémédication. Retrait des doses par mg/kg du tableau 3 pour laisser uniquement la dose maximale par animal en mg/kg.