


Monocrotaline



Numéro de CAS	État et concentration utilisés	Technique (s) d'administration	État de la substance à l'état pur
315-22-0	En solution 120mg/ml et moins	SC	Poudre

Catégorie de risque	 Cancérogène
Responsabilité du chercheur	Le chercheur doit informer le responsable de l'animalerie 1 semaine avant l'utilisation de la monocrotaline.
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> • Placer cette procédure dans le cartable de la pièce d'hébergement et celui de la laverie. • Inscrire sur les cages contaminées « monocrotaline » et la date de la dernière administration.
Précautions de base	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer d'effectuer des contentions sécuritaires et/ou d'employer un anesthésique au besoin. • Préparer si possible les mélanges avant d'entrer dans l'animalerie. • Si possible, utiliser les seringues avec aiguilles rétractables. Lorsque nécessaire, remettre le capuchon de l'aiguille à une main. • Manipulation réservée au personnel autorisé et formé adéquatement.
EPI	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter l'EPI de base en animalerie. • Équipement supplémentaire requis : <ul style="list-style-type: none"> ○ lunette de sécurité. • L'EPI doit être à usage dédié aux animaux contaminés.
Administration du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Placer un papier absorbant plastifié sur la surface de travail avant l'administration. • Utiliser une hotte chimique.
Hébergement	<ul style="list-style-type: none"> • Hébergement standard avec couvercle filtre.
Changements de cages	<ul style="list-style-type: none"> • Changement de cage standard minimalement sous station de changement de cage. • Identifier les cages souillées « monocrotaline » et envoyer au laveur.

Nettoyage des surfaces de travail	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la surface à l'eau savonneuse. • Rincer avec de l'eau.
Procédure en cas de déversement mineur	<ul style="list-style-type: none"> • Sortir de la pièce. • Se référer à la fiche signalétique et aux procédures en place dans votre établissement.
Laverie	<ul style="list-style-type: none"> • Porter l'EPI cité plus haut en plus d'une visière ou une paire de lunettes étanches. • Procéder au lavage régulier.
Disposition des déchets	<ul style="list-style-type: none"> • Litière ; déchets contaminés ; EPI ; carcasses : sac biorisque fermé hermétiquement.
Premiers soins	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Contact avec les yeux</u> : rincer à l'eau pendant 15 minutes minimum. Consulter un médecin. • <u>Contact avec la peau</u> : retirer les vêtements contaminés, nettoyer la peau avec un savon doux et rincer abondamment pendant 15 minutes minimum. Consulter un médecin. • <u>Inhalation</u> : amener la personne dans un endroit aéré. Consulter un médecin. • <u>Ingestion</u> : Se rincer la bouche. Consulter un médecin.

Si vous expérimentez un problème, quel qu'il soit (ex. émanations d'odeur) vous devez aviser la personne responsable de l'animalerie afin que les mesures soient resserrées au besoin.