



## Imiquimod



Numéro de CAS	État et concentration utilisés	Technique (s) d'administration	État de la substance à l'état pur
99011-02-6	En solution / 1mg/kg et moins	injection	solide

<b>Catégorie de risque</b>	 Très toxique en cas d'ingestion / Irritant modéré pour la peau, les yeux et le système respiratoire
<b>Responsabilité du chercheur</b>	Le chercheur doit informer le responsable de l'animalerie 1 semaine avant l'utilisation de l'imiquimod.
<b>Affichage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer cette procédure dans le cartable de la pièce d'hébergement et celui de la laverie.</li> <li>• Inscrire sur les cages contaminées imiquimod et la date de la dernière administration.</li> </ul>
<b>Précautions de base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer d'effectuer des contentions sécuritaires et/ou d'employer un anesthésique au besoin.</li> <li>• Préparer si possible les mélanges avant d'entrer dans l'animalerie.</li> <li>• Si possible, utiliser les seringues avec aiguilles rétractables. Lorsque nécessaire, remettre le capuchon de l'aiguille à une main.</li> <li>• Manipulation réservée au personnel autorisé et formé adéquatement.</li> </ul>
<b>EPI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter l'EPI de base en animalerie.</li> <li>• Équipement supplémentaire requis :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ lunette de sécurité;</li> <li>○ doubles gants.</li> </ul> </li> <li>• L'EPI doit être à usage <b>dédié</b> aux animaux contaminés.</li> </ul>
<b>Administration du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer un papier absorbant plastifié sur la surface de travail avant l'administration.</li> <li>• Utiliser une <b>hotte chimique</b> ou une <b>enceinte de sécurité biologique classe II type A2</b>.</li> </ul>
<b>Hébergement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hébergement standard</li> </ul>

<p><b>Changements de cages</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La litière est considérée contaminée jusqu'à 3 jours après la dernière administration et demande des manipulations particulières : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ transférer les animaux dans des cages propres <b>minimalement sous station de changement de cage;</b></li> <li>○ placer un papier absorbant plastifié sur la surface de changement de cage;</li> <li>○ vaporiser de l'eau sur la litière et les cages contaminées pour diminuer les poussières ;</li> <li>○ placer les cages contenant la litière dans des sacs identifiés imiquimod et envoyer au laveur;</li> <li>○ jeter le papier absorbant plastifié dans un sac biorisque double épaisseur identifié imiquimod.</li> </ul> </li> <li>• Retirer cette procédure de la pièce 3 jours après la dernière administration.</li> </ul>
<p><b>Nettoyage des surfaces de travail</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer la surface à l'eau savonneuse.</li> <li>• Rincer avec de l'eau.</li> </ul>
<p><b>Procédure en cas de déversement mineur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortir de la pièce.</li> <li>• Se référer à la fiche signalétique et aux procédures en place dans votre établissement.</li> </ul>
<p><b>Laverie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter l'EPI cité plus haut en plus d'une <b>visière</b> ou une paire de <b>lunettes étanches</b>.</li> <li>• Vaporiser les cages et la litière souillées avec de l'eau savonneuse.</li> <li>• Jeter la litière dans un sac biorisque double épaisseur identifié imiquimod.</li> <li>• Rincer les cages et procéder au lavage régulier.</li> </ul>
<p><b>Disposition des déchets</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Litière ; déchets contaminés ; EPI ; carcasses : sac biorisque double épaisseur ou récipient biorisque fermé hermétiquement et identifié imiquimod.</li> </ul>
<p><b>Premiers soins</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Contact avec les yeux</u> : rincer à l'eau pendant 15 minutes minimum. Consulter un médecin.</li> <li>• <u>Contact avec la peau</u> : retirer les vêtements contaminés, nettoyer la peau avec un savon doux et rincer abondamment pendant 15 minutes minimum. Consulter un médecin.</li> <li>• <u>Inhalation</u> : amener la personne dans un endroit aéré. Consulter un médecin.</li> <li>• <u>Ingestion</u> : Se rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin.</li> </ul>

*Si vous expérimentez un problème, quel qu'il soit (ex. émanations d'odeur) vous devez aviser la personne responsable de l'animalerie afin que les mesures soient resserrées au besoin.*