



UNIVERSITÉ  
LAVAL

Direction des services vétérinaires

Procédure normalisée de fonctionnement

Objet : Gestion des colonies internes de souris	Numéro : RE-1
Portée : Ceci est une directive de la Direction des services vétérinaires (DSV) à l'intention des utilisateurs et du personnel des animaleries de l'Université Laval et des centres de recherche affiliés.	
Préparée par Claudia Toulouse <i>Technicienne en santé animale conformité, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 20 janvier 2015
Modifiée par Claudia Toulouse <i>Technicienne en santé animale conformité, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 7 décembre 2017
Révisée par Anne-Marie Catudal <i>Vétérinaire clinicienne, Direction des services vétérinaires</i>	Date : 12 janvier 2018
But : Décrire la gestion de souris produites par des colonies internes. Documenter le phénotype des animaux provenant de ces colonies.	Version 3

## Généralités

- Les animaux destinés à l'établissement d'une colonie interne doivent provenir de fournisseurs reconnus et être exempts de pathogènes exclus (voir PNF CQ-2 Statuts de santé des animaleries de rongeurs) ou être redérivés (voir PNF IE-1 Acquisition de rongeurs de sources non approuvées).
- La mise en place et la gestion d'une colonie de souris doivent d'abord recevoir l'approbation du comité de protection des animaux (CPA).
- Il est primordial de s'assurer que le nombre d'animaux produits est maintenu au minimum. Il doit couvrir les besoins pour le maintien de la colonie et le transfert d'animaux sur le protocole expérimental.
- Le CPA encourage fortement l'utilisation de la cryopréservation afin de réduire le nombre d'animaux produits et de préserver la lignée en cas d'imprévus.
- Afin de prévenir la dérive génétique, il est recommandé d'effectuer un rétro-croisement (*backcross*) de la lignée après 10 générations. Les animaux utilisés ne doivent pas être des animaux wt provenant de la colonie. Il est important de connaître le fond génétique de la lignée (ex. une C57BL/6J n'est pas équivalente à une C57BL/6N).
- Le professeur responsable, en collaboration avec le personnel technique de l'animalerie, doit tenir à jour la documentation adéquate dans la base de données Darwin pour s'assurer que le nombre d'animaux utilisés pour la reproduction, le nombre de naissances, le nombre d'animaux transférés sur protocole expérimental et le nombre d'animaux non utilisés correspond à ce qui a été approuvé par le CPA.

- Le professeur responsable, en collaboration avec le personnel technique de l'animalerie, doit effectuer un suivi serré du succès des couples reproducteurs et le documenter afin d'assurer une saine gestion de la colonie.
- Le professeur responsable, en collaboration avec le personnel technique de l'animalerie, doit déterminer le phénotype des animaux provenant de sa colonie, en fonction de la modification génétique de l'animal, du sexe et de l'âge. Une bonne connaissance du phénotype permet d'adopter des points limites qui permettront de réduire l'inconfort et la détresse pouvant être associés à certains traits phénotypiques.
- Tous les phénotypes pouvant nuire à la santé de l'animal ainsi que les soins nécessaires doivent être identifiés dans les protocoles, dans Darwin et connus du personnel de l'animalerie.
- Une formation spécifique pour la gestion de colonie est offerte par la DSV et est recommandée pour tous ceux qui ont à gérer des colonies.
- La stratégie de reproduction sera choisie en fonction des besoins, mais devra tenir compte en tout temps du bien-être des animaux reproducteurs et des normes d'hébergement (espace requis par portée).
- Seuls les animaux en santé doivent être utilisés pour la reproduction.
- Chaque souris adulte doit disposer de 100 cm<sup>2</sup> de surface. Chaque portée devrait aussi disposer de 100 cm<sup>2</sup>.
- Tous les animaux en reproduction doivent avoir accès à du matériel de nidification. Un supplément de graines de tournesol peut favoriser la reproduction.

## Définitions

- Allèle : représente une des différentes versions possibles d'un gène, occupant la même position sur un chromosome spécifique.
- Hémizygote : lorsque pour un gène, un seul allèle existe (ex. gène situé sur le chromosome sexuel X d'un mâle).
- Hétérozygote : lorsque pour un gène, deux allèles différents sont présents sur les deux chromosomes homologues.
- Homozygote : lorsque pour un gène, deux allèles identiques sont présents sur les deux chromosomes homologues. La première portée d'un couple homozygote devrait toujours être génotypée.
- Knock-in (KI) : inactivation d'un gène et remplacement de celui-ci par un gène d'intérêt.
- Knockout (KO) : inactivation complète d'un gène.
- Lignée transgénique : lorsque les descendants d'un animal auquel un ou plusieurs gènes ont été introduits à son génome par transgénèse ont incorporé de façon stable ces gènes.

- Système Cre-lox : technologie permettant à un gène d'être ciblé après une période critique du développement. Pour avoir une lignée cre-lox, trois différentes lignées doivent être maintenues : la lignée cre, la lignée loxP, et la lignée cre-lox.
- Rétrocroisement (backcross) : le croisement d'un hybride avec l'un de ses parents ou avec un individu similaire sur le plan génétique à l'un de ses parents, de manière à obtenir un descendant ayant une identité génétique plus proche de celle du parent. Afin de s'assurer que le fond génétique est pur et testé, il est recommandé de faire le rétrocroisement avec un animal provenant d'un fournisseur reconnu. Le « N » décrit le nombre de rétrocroisements effectués.

## Procédures

### Reproduction

#### Choix des reproducteurs

- Le professeur responsable, ou autre personne déléguée, détermine quels seront les animaux à reproduire.
- Les animaux mis en accouplement doivent avoir au minimum 8 semaines d'âge.
- Les animaux en bonne santé pourraient être utilisés à partir de 6 semaines de façon exceptionnelle dans les circonstances suivantes :
  - Lignée avec une fenêtre de reproduction très courte ;
  - Établissement d'une lignée comportant plusieurs transgènes ;
  - Lignée en péril.
- Les couples reproducteurs sont normalement remplacés lorsqu'il y a diminution significative du nombre de naissances par portée ou lorsqu'il y a un intervalle d'environ deux mois entre les portées.

#### Choix de la stratégie de reproduction – simple (monohybride)

- Homo (-/-) X Homo (-/-) : À utiliser quand les animaux mutants des deux sexes sont fertiles et viables. 100 % des naissances seront -/-.
- Hétéro (+/-) X Homo (-/-) : À utiliser quand les animaux mutants d'un des deux sexes sont infertiles ou non viables. À utiliser si le phénotype n'est observé que chez les -/- et que des animaux contrôles de la même portée sont requis. 50 % des naissances seront -/- et 50 % seront +/-.
- Hétéro (+/-) X Hétéro (+/-) : À utiliser quand les animaux mutants des deux sexes sont infertiles, malades, qu'il y a mort embryonnaire ou que les souriceaux meurent avant d'atteindre l'âge du sevrage. À utiliser si les +/- ont un phénotype intermédiaire. 25 % des naissances seront -/-, 50 % seront +/- et 25 % seront +/+.

## Choix de la stratégie de reproduction – complexe

Lorsque des lignées comportant plusieurs transgènes sont reproduites, la stratégie de reproduction doit être adaptée aux résultats de génotypage recherchés. Il faut toutefois tenter d'éliminer l'expression de phénotypes indésirables, tel que mortalité embryonnaire, et infertilité.

### Mise en accouplement

- Normalement, les accouplements sont faits de façon monogame (1 mâle avec 1 femelle), en trio (1 mâle avec 2 femelles) ou en rotation (1 mâle avec 2 femelles/semaine).
- Le temps de gestation est en moyenne de 19 à 21 jours. Les souris peuvent être reproduites de façon continue en utilisant l'œstrus postpartum, lorsque les besoins en animaux sont grands.
- La tenue de registre des dates de naissance et l'identification de la mère des souriceaux est plus difficile lorsqu'il y a 2 femelles dans la même cage.
- La surpopulation dans les cages doit être évitée. Lorsque la stratégie « trio » est utilisée, le mâle doit être retiré de la cage avant la mise bas afin d'éviter que les femelles aient chacune deux portées en même temps dans la cage.

Note : Le mâle doit alors être placé seul dans une cage propre.

- Lorsque la stratégie « trio » est utilisée pour les lignées ayant en moyenne plus de 10 bébés, les femelles devront être séparées avant la mise bas.
- Les informations sur les naissances doivent être inscrites sur le carton de cage et dans Darwin.
- Il est recommandé de ne pas déranger les nouvelles portées dans les premiers jours après la naissance pour éviter de stresser la mère.

### **Adoption**

- Retirer la mère adoptive de sa cage.  
Note : Il est préférable de choisir une femelle adoptive qui a des souriceaux du même âge que ceux qui seront transférés. Des portées d'âges différents peuvent être mélangées avec un succès variable.
- Retirer la majorité des bébés de la femelle adoptive. Le total de bébés ne devrait pas dépasser 8.
- Transférer la portée à adopter dans la cage et froter les bébés avec la litière souillée pour qu'ils aient la même odeur que les bébés d'origine. Ajouter du matériel de nidification au besoin.
- Remettre la mère adoptive dans sa cage.

- Replacer la cage sur le support et surveiller le comportement de la mère pour quelques minutes. Si elle prend soin immédiatement de sa nouvelle portée, le transfert a bien fonctionné. Si elle disperse les bébés partout dans la cage, il est peu probable qu'elle s'occupe d'eux. Continuer l'observation au cours des heures suivantes et répéter l'opération avec une nouvelle mère adoptive au besoin.

## **Sevrage**

- Sevrer les animaux entre 21 et 28 jours, selon les lignées. Le poids au sevrage devrait être d'environ 8 à 12 grammes.
- Si les souris sont reproduites de façon continue, il est important de respecter les temps de sevrage pour éviter d'avoir une femelle en lactation avec une portée de 21 jours et une nouvelle portée.
- Le jour du sevrage, séparer les animaux par sexe. Le nombre d'animaux par cage dépend de la grandeur de celle-ci et des caractéristiques spécifiques à la souche de souris (ex. : agressivité).

Note : Il est possible de combiner des mâles de portées différentes au sevrage seulement. Il est généralement possible de combiner des femelles d'âges différents sans problème. Il est préférable de ne pas héberger une souris nouvellement sevrée seule.

- Faciliter l'accès à la nourriture aux animaux en plaçant des croquettes dans le fond de la cage.
- Si les animaux sont trop petits à la date de sevrage prévue, laisser les animaux avec la mère plus longtemps.
- Si la mère décède avant la date de sevrage prévue :
  - Tenter l'adoption si les souriceaux ont moins de 16 jours ;
  - Appliquer la procédure décrite dans PNF TX-1, annexe 1, si les souriceaux sont âgés de 16 jours ou plus.
- Si les souriceaux d'une lignée particulière ont un taux de croissance plus lent, éviter la reproduction en continu pour permettre un sevrage plus tardif.

## **Identification et génotypage**

- Voir les PNF ID-1 et TS-1 pour l'identification des rongeurs et le génotypage.

## **Points limites**

- Les femelles reproductrices doivent être remplacées lorsqu'elles atteignent 8 mois d'âge ou 5-6 portées. Les mâles doivent être remplacés après un maximum de 1 an. Maintenir des reproducteurs au-delà de cet âge entraîne souvent une mauvaise gestion de l'espace et du temps technique.

- Les animaux en bonne santé pourraient être utilisés au-delà de ces limites de façon exceptionnelle dans les circonstances suivantes :
    - Lignée en péril ;
    - Validation des reproducteurs de la prochaine génération ;
    - Femelle dont le nombre de souriceaux par portée se maintient.
  - Suite au décès d'une deuxième portée consécutive issue d'une même femelle, la retirer de la reproduction.
  - En cas de cannibalisme, euthanasier les souriceaux blessés et faire adopter les souriceaux survivants. Il est préférable de remplacer la femelle cannibale.
- Note : Un taux plus élevé de cannibalisme est observé chez les femelles primipares.
- Traiter la dystocie selon la PNF TX-1, annexe 1.
  - Fournir une grille de points limites précise pour toute lignée ayant un phénotype nécessitant des soins particuliers.
  - Utiliser la fiche d'observation des souris génétiquement modifiées pour détecter de nouveaux phénotypes. Une grille de points limites pourra ensuite être produite et utilisée afin de réduire l'inconfort et la détresse pouvant être associés à ces traits phénotypiques.

## Documentation

- Remplir adéquatement tous les cartons de cage.
- Entrer toutes les informations relatives aux reproducteurs, naissances et animaux transférés sur protocole expérimental dans la base de données Darwin.
- Pour toute nouvelle lignée de souris transgéniques, remplir la fiche d'observation des souris génétiquement modifiées et la conserver dans le local d'hébergement ou remplir la section appropriée dans Darwin.

## Références

CCPA, *Manuel sur le soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation*, 1993.

Fox, James G., *The Mouse in Biomedical Research: Normative Biology, Husbandry, and Models*, Academic Press, 2007.

Pritchett-Corning, KR, Chou, ST, Conour, LA, Elder, BJ, *Guidebook on Mouse and Rat Colony Management*, Charles River Laboratories, 2011.

The Jackson Laboratory, *Breeding Strategies for Maintaining Colonies of Laboratory Mice, A Jackson Laboratory Resource Manual*, 2009.

Mises à jour de la PNF		
Version 2	6 décembre 2016	Ajout de précisions concernant les âges des reproducteurs.
Version 3	7 décembre 2017	Ajout de précisions concernant les souris wt utilisées pour le rétrocroisement.