UNIVERSITÉ LAVAL
Direction des services vétérinaires

# SUIVI D'ANESTHÉSIE

| | |
|---|---|
| Date : | Protocole : |
| Chercheur : | |
| Identification : | Poids : |
| Intervention : | |
| Anesthésiste : | |

| | Prémédication | Induction |
|---|---|---|
| Produit | | |
| Dose | | |
| Voie d'admin | | |
| Heure | | |

| heure | | |

**Suivi de la procédure** **heure**

**Poids (kg) :** _____

**Drogues d'urgence**

| Drogue | Espèce | Dose | Volume |
|---|---|---|---|
| Épinéphrine (doses suivantes répétées 3-5 min) | *chien, chat (1e dose) | 0,01 mg/kg IV | |
| | *chien, chat (suite) | 0,1 mg/kg IV | |
| | furet, lapin | 0,2 mg/kg IV | |
| | PNH | 0,2-0,4 mg/kg IT | |
| | porc | 0,01 mg/kg IV | |
| Atropine* | lapin | 0,1-0,5 mg/kg SC | |
| | autres espèces | 0,04 mg/kg IV | |
| Glycopyrrolate | lapin | 0,01 mg/kg SC | |
| | autres espèces | 0,01 mg/kg IM | |
| Lidocaine (arrythmies) | chat, furet | 0,2-0,4 mg/kg IV | |
| | lapin | 2 mg/kg IV | |
| | chien, porc, PNH | 2-4 mg/kg IV | |
| | toutes espèces | 50 µg/kg/min IV | |
| Fluides isotoniques | chien, porc | 90 ml/kg IV | |
| | chat , PNH | 60 ml/kg IV | |
| | furet, lapin | 20 ml/kg IV | |

* Si la drogue est administrée intra-trachéal, doubler la dose, mélanger à de la saline pour obtenir un volume d'environ 5 ml.

**Réveil**

Complication : oui ☐ non ☐
Heure du réveil : _____
Température : _____
Heure du retour en cage : _____
Notes :